

University of Groningen

Enkele aspecten van hernia nucleï pulposi lumbalis

Hoving, Eelco Wieger

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1959

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Hoving, E. W. (1959). Enkele aspecten van hernia nucleï pulposi lumbalis. [S.l.]: [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

I

Bij de behandeling van patiënten met hernia nuclei pulposi lumbalis verdienen somatische, psychische en sociale factoren gelijktwaardige aandacht.

II

De anatomische verhoudingen van de vena umbilicalis t.o.v. de ductus venosus zijn mede bepalend voor het gunstige resultaat van een wisseltransfusie bij neonati.

III

Bij de behandeling van kinderen met een acute glomerulonefritis geve men alleen dieetbeperkingen op strikte indicatie.

IV

Voor het routine-onderzoek van urine op glucose verdient de reactie met glucose-oxydase ruimere toepassing.

V

Het is wenselijk, dat het onderwijs in de praktische verloskunde aan de Universiteit over het algemeen meer afgestemd wordt op de algemene praktijk.

VI

Bij een otitis media acuta purulenta is het gebruik van chemotherapeutica of antibiotica zonder toepassing van paracentese een kunstfout.

VII

De indeling van het ziektebeeld erythema exsudativum multiforme in een idiopathische en een symptomatische vorm is gerechtvaardigd.

VIII

Bij perforerende oogletsels is het gewenst naast de eerste hulp chlooramfenicol per os toe te dienen.

IX

De bij keuringseisen voor militairen en zeelieden aangegeven normen voor het gehooronderzoek dienen als obsoleet te worden beschouwd.

X

Een naevus pigmentosus, die groeit, van kleur verandert, bloedt of ulcereert, dient behandeld te worden met hoge dosis röntgenstralen.

XI

De jeugd in de Friese Weidestreek en de jeugd in de Friese Wouden verschillen van elkaar op karakterologisch en op intellectueel gebied.